

植物性の便秘薬 サトラックス®

**第2類
医薬品**

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

植物性の便秘薬 サトラックス®

△ 使用上の注意

⊗してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
3. 大量に服用しないでください

■相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。
はげしい腹痛、悪心・嘔吐
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、悪心・嘔吐

- (2) 1週間位服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください
下痢

★裏面につづく

【効 能】

●便秘 ●便秘に伴う次の諸症状の緩和：吹出物、肌あれ、頭重、のぼせ、腹部膨満、腸内異常發酵、食欲不振(食欲減退)、痔

【用法・用量】

下記の1回服用量をなるべく空腹時にコップ一杯の水又はお湯でかまずに服用します。服用間隔は4時間以上おいてください。ただし、初回は最小量を用い、使進の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
大人(15才以上)	4～8g	2回を限度とします
15才未満	服用しないでください	

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) かならずコップ一杯(約180mL)の水又はお湯でかまずに服用してください。

【成分・分量と働き】8g中

成 分	分 量	働 き
ブランタゴ・オバタ種子	4.336g	腸内で水分を吸収して容積を増し、適度な硬さの便をつくれます。また、腸のぜん動をうながして自然に近いお通しを誘います。
センナ実	0.992g	衰えた腸の運動を高め、排便をうながします。

添加物として、白糖、タルク、アラビアゴム、流動パラフィン、パラフィン、三二酸化鉄、香料、L-メントールを含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 本剤は、吸湿性がありますので、服用後はフタをしっかりしめて保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)

副作用救済制度 ☎0120-149-931

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお問い合わせください。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間:9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号
提携 マダウス社<ドイツ>

5

2012年6月 記載要領変更に伴う改訂

第2類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



植物性の便秘薬

サトラックス® 「分包」

サトラックス「分包」は…

- 腸内で膨潤することにより、自然に近いお通じを誘う植物性の便秘薬です。
- 日頃から便秘がちの方に。
- 便が硬く、排便が困難な方に。
- 便秘により、吹出物、肌あれ、お腹がはる、食欲がないなどの症状のある方に。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
3. 大量に服用しないでください

🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 次の症状のある人。
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
下痢
4. 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください



【効能】

- 便秘
- 便秘に伴う次の諸症状の緩和：吹出物、肌あれ、頭重、のぼせ、腹部膨満、腸内異常発酵、食欲不振(食欲減退)、痔

【用法・用量】

下記の1回服用量をなるべく空腹時にコップ一杯の水又はお湯でかまずに服用します。服用間隔は4時間以上おいてください。

年齢	1回服用量	1日服用回数
大人(15才以上)	1~2包	2回を限度とします
15才未満		服用しないでください

ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。

【用法・用量に関連する注意】

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 1日最大4包までを限度として服用してください。

【成分・分量と働き】1包(4g)中

成分	分量	働き
プランタゴ・オバタ種子	2.168g	腸内で水分を吸収して容積を増し、適度な硬さの便をつくります。また、腸のぜん動をうながして自然に近いお通じを誘います。
センナ実	0.496g	衰えた腸の運動を高め、排便をうながします。

添加物として、白糖、タルク、アラビアゴム、流動パラフィン、パラフィン、三二酸化鉄、香料(ℓ-メントールを含む)を含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



◎ご使用に際してのアドバイス

- 一般に便秘薬の有効量は個人差がありますので、便通の具合をみて、1回1~2包を1日1~2回の範囲で増減してください。
- かならずコップ一杯(約180mL)の水又はお湯でかまずに服用してください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの
お店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間：9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号
提携
マダウス社 <ドイツ>